Ehrlichiosi

Test SNAP* 4Dx* Plus o Test SNAP* Leish 4Dx*

Cane con sintomi clinici

Cane asintomatico/screening

Negativo

+ Esami di laboratorio del Minimum DataBase (emocromo, profilo biochimico con SDMA, esame delle urine con UPC)
+ Profili specifici con ricerca di Ac e PCR† e/o ripetizione del test SNAP dopo 2 - 3 settimane

+ Gli esami per *Ehrlichia* si confermano negativi, l'ehrlichiosi è poco probabile

Valutare altre diagnosi differenziali

Positivo

Esami di laboratorio del Minimum DataBase (emocromo, profilo biochimico con SDMA, esame delle urine con UPC) con valutazione dello striscio ematico su un campione di sangue intero fresco

+ Esami di laboratorio compatibili con infezione da *Ehrlichia*; considerare la PCR† real-time per *Ehrlichia*

Terapia

+ Ripetere gli esami di laboratorio MDB per valutare la risposta clinica dopo 1 settimana; considerare la PCR† dopo il trattamento

Esami di laboratorio non sospetti di infezione da *Ehrlichia*

Un risultato positivo per *Ehrlichia* indica la presenza di anticorpi contro *Ehrlichia*; in un cane senza segni clinici e con un MDB normale, ciò può indicare una precedente esposizione a una zecca infettata da *Ehrlichia* spp.

Negativo

Infezione improbabile; rivedere i benefici della prevenzione delle zecche; ripetere annualmente il test per le malattie trasmesse dalle zecche

†Fase acuta PCR su sangue, fasi subacute/croniche PCR su midollo, linfonodi, milza.

© 2023 IDEXX Laboratories, Inc. Tutti i diritti riservati. • 09-2690088-00 • L'informativa sulla privacy di IDEXX è disponibile all'indirizzo www.idexx.com.

*4Dx e SNAP sono marchi commerciali o marchi registrati di IDEXX Laboratories, Inc. o delle sue affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.